

Tiếng Anh 8 Unit 9: Read

Composite Start Composite End

Unit 9: A First-Aid Course

Read (Trang 83-84 SGK Tiếng Anh 8)

Case	First-aid
Fainting	<ul style="list-style-type: none">- Leave the patient lying flat.- Don't force him / her to sit or stand.- Elevate the patient's feet, or lower his /her head below the level of the heart.- Don't let the victim get cold.- Give the victim a cup of tea when he / she revives.
Shock	<ul style="list-style-type: none">- Don't overheat the victim with blankets or coats.- Don't give the victim any food or drink.- Don't give the victim drugs or alcohol.
Burns	<ul style="list-style-type: none">- Cool the burns immediately so as to minimize tissue damage.- Put the affected part under a running cold tap (if possible).- Ease pain with ice or cold water packs.- Cover the burned area with a thick sterile dressing.

Hướng dẫn dịch:

Trường hợp	Sơ cứu
Ngất xỉu	<ul style="list-style-type: none">- Để bệnh nhân nằm thẳng.- Không cho bệnh nhân ngồi hoặc đứng.- Cho nằm đầu thấp hoặc nâng chân của bệnh nhân cao hơn so với mặt phẳng của tim.- Không để nạn nhân lạnh.- Khi nạn nhân tỉnh lại thì cho uống một tách trà.
Sốc	<ul style="list-style-type: none">- Không làm bệnh nhân quá nóng với chăn và áo choàng ngoài.- Không cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.- Không cho bệnh nhân uống thuốc hoặc rượu.
Bỏng	<ul style="list-style-type: none">- Lập tức làm lạnh vết bỏng để hạn chế tối đa tổn thương mô.- Cho vùi nước lạnh chảy trên vùng bị tổn thương (nếu có thể).- Giảm đau với túi chườm đá hoặc nước mát.- Dùng gạc vô trùng dày băng vết thương lại.

Choose a correct case for each of the following treatments.

(Hãy chọn trường hợp cấp cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây.)

a) The victim should not sit or stand.

=> **A (Fainting)**

b) Victim cannot drink wine or beer.

=> **B (Shock)**

c) The victim's head should be below the level of the heart.

=> **A (Fainting)**

d) You should ease the pain with ice or cold water packs.

=> **C (Burns)**

e) The victim should drink a cup of tea when reviving.

=> **B (Fainting)**